SUMMUM
LABORATOIRE DENTAIRE | DENTAL LABORATORY

/ ORTHODONTIE
coquilles évolutives

○ Homme
○ Femme

Patient/Patiente

No de dossier

Date de naissance
j j m m a a

Dentiste

No de téléphone

Addresse

DATE DE LA DEMANDE
d d m m y y

DATE REQUISE
d d m m y y

Préciser les arcs traités

○ Mâchoire supérieur ○ Mâchoire inférieur

Préciser les dents à ne pas déplacer

☐ 18	☐ 17	☐ 16	☐ 15	☐ 14	☐ 13	☐ 12	☐ 11	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	
☐ 48	☐ 47	☐ 46	☐ 45	☐ 44	☐ 43	☐ 42	☐ 41	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	

☐ 55	☐ 54	☐ 53	☐ 52	☐ 51	☐ 61	☐ 62	☐ 63	☐ 64	☐ 65
☐ 85	☐ 84	☐ 83	☐ 82	☐ 81	☐ 71	☐ 72	☐ 73	☐ 74	☐ 75

Modifications de la ligne médiane dentaire

Mâchoire supérieure

Gauche ○ 1 à 2 mm ○ 2+ mm

Droite ○ 1 à 2 mm ○ 2+ mm

Mâchoire inférieur

Gauche ○ 1 à 2 mm ○ 2+ mm

Droite ○ 1 à 2 mm ○ 2+ mm

Surplomb

○ Maintenir ○ Améliorer (saisir les spécifications comme les changements de réduction interproximale ou de relation sagittale)

Surocclusion

○ Maintenir ○ Améliorer (saisir les spécifications comme les instructions pour la chirurgie)

Espacement

☐ Mâchoire supérieure

○ Fermer tous les espaces

○ Laisser des espaces (préciser la position et la quantité d'espace)

☐ Mâchoire inférieure

○ Fermer tous les espaces

○ Laisser des espaces (préciser la position et la quantité d'espace)

Relation sagittale (antéro-postérieure)

Maintenir

☐ Côté gauche ☐ Côté droit

Modifié

☐ Côté gauche

Canine en ◯ Classe I ◯ tendance à Classe II ◯ Classe II ◯ tendance à Classe III ◯ Classe III

Molaire en ◯ Classe I ◯ tendance à Classe II ◯ Classe II ◯ tendance à Classe III ◯ Classe III

☐ Côté droit

Canine en ◯ Classe I ◯ tendance à Classe II ◯ Classe II ◯ tendance à Classe III ◯ Classe III

Molaire en ◯ Classe I ◯ tendance à Classe II ◯ Classe II ◯ tendance à Classe III ◯ Classe III

◯ Réduction interproximale (IPR) afin d'atteindre l'objectif antéro-postérieur

◯ Distalisation des unités postérieures (contrôle d'ancrage avec élastiques intermaxillaires de classe II ou III)

◯ Fermeture d'espaces postérieurs / Extraction

◯ Stimuler le déplacement des maxillaires dans le cadre d'une intervention chirurgicale

Occlusion croisée postérieure

◯ Maintenir ◯ Corriger

Encombrement

☐ Mâchoire supérieure

◯ Expansion

◯ Proclination

◯ IPR ◯ Aucun ◯ Notamment ◯ Au besoin

☐ Mâchoire inférieure

◯ Expansion

◯ Proclination

◯ IPR ◯ Aucun ◯ Notamment ◯ Au besoin

Extractions (sélectionner les dents)

☐ 18	☐ 17	☐ 16	☐ 15	☐ 14	☐ 13	☐ 12	☐ 11	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28
☐ 48	☐ 47	☐ 46	☐ 45	☐ 44	☐ 43	☐ 42	☐ 41	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38

☐ 55	☐ 54	☐ 53	☐ 52	☐ 51	☐ 61	☐ 62	☐ 63	☐ 64	☐ 65
☐ 85	☐ 84	☐ 83	☐ 82	☐ 81	☐ 71	☐ 72	☐ 73	☐ 74	☐ 75

Différence de taille des dents : si tous les espaces supérieurs ne peuvent pas être fermés, il faut laisser de l'espace.

◯ Position distale vers 2s

◯ Position distale vers 3s

◯ Également autour de 2s

◯ Réduction interproximale (IPR) sur l'arc opposé pour fermer tous les espaces

◯ Instructions particulières

Instructions pour la surcorrection (préciser)

Numéro de la dent _____

Direction _____

Magnitude _____

Notes

_____

_____

_____

Signature _____

No. de permis _____